



Европейское респираторное общество (*ERS*) совместно с Американским торакальным обществом (*ATS*) уделяет большое внимание разработке и применению на практике современных клинических рекомендаций и стандартов, которые в последние годы отличаются наиболее высоким уровнем с позиции медицины, основанной на доказательствах.

Так, совместная исследовательская группа *ERS* и *ATS* подготовила протокол исследования функции внешнего дыхания (ФВД). Эти уникальные эпидемиологические исследования были проведены в Америке и позволили установить, что у более 25 % населения выявляются обструктивные нарушения ФВД. В результате исследований был отмечен тот факт, что по имеющимся показателям некоторые люди должны были квалифицироваться как больные, но активных жалоб на тот момент пока не предъявляли.

Серьезная проблема в практике врачей всех специальностей, включая, конечно, аллергологов и пульмонологов, — это ведение больных, страдающих хроническим кашлем. Есть определенная категория больных, у которых кашель является не только доминирующим симптомом, но и остается неясной природы его возникновения. *ERS* подготовило клинические рекомендации по диагностике и ведению таких больных. Это первый официальный документ,

в котором обобщен предшествующий опыт и определены перспективы дальнейшей работы над совершенствованием этих клинических рекомендаций.

Большим достижением в работе *ERS* и *ATS* являются совместные клинические рекомендации, которые посвящены такой проблеме, как ХОБЛ. Структура самого документа соответствует современной методике подачи материала, поэтому врачи смогут найти предельно ясную и четкую информацию, касающуюся эпидемиологии, определения патофизиологии, критериев обострения ХОБЛ, определения стабильной фазы, определения той стадии болезни, когда необходимо активно назначать методы респираторной поддержки, показания к редукции объема легочной ткани, к трансплантации легких у больных, страдающих этими заболеваниями. Особое место уделяется диагностике и стандартизации методов лечения. В случаях лечения ХОБЛ наблюдается медленное, но прогрессивное движение вперед.

Интерпретация функциональных тестов всегда вызывает определенные сложности и является отдельной областью изучения в клинической респираторной физиологии. За последние годы здесь достигнут определенный прогресс, который является действительно большим достижением в области трактовки функциональных изменений, наступающих у больных с различными респираторными заболеваниями.

В центре внимания вновь находится бронхиальная астма (БА), особенно это касается тяжелых форм заболевания и то, о чем так активно пишет *проф. Рабе*, — это низкий процент больных, получающих адекватное лечение. Применяемые методы лечения, в частности использование моноклональных антител против иммуноглобулинов класса Е и использование антител против туморнекротического фактора α , оказались достаточно эффективными. *ERS* подвело итог современных подходов лечения БА в различных аспектах, формах, что необходимо и очень важно.