



Одна из функций сайта Европейского респираторного общества – информационная поддержка врачей, занимающихся респираторной медициной. Высокоприоритетные и рекомендуемые к прочтению работы, специально отобранные экспертами ERS, можно найти по ссылке <http://dev.ersnet.org/40-paper-recommendations.htm#par2997>. Вот примеры из такой выборки на конец августа 2009 г.

*A.Ferreira et al. (Chest 2009; 135 (2): 442–447)* обсуждают проблему легочной реабилитации при интерстициальных заболеваниях легких. Они отметили, что доступная информация по этой проблеме ограничена, но существующие исследования свидетельствуют о целесообразности рассмотрения легочной реабилитации как составляющей ведения пациентов с такой патологией.

Руководство по интерстициальным заболеваниям легких разработали комитет по стандартам Британского торакального общества и торакальные общества Австралии, Новой Зеландии и Ирландии (*Thorax 2008; 63 (suppl. 5): v1–v58*).

*K.Fan Chung и I.D.Pavord (Lancet 2008; 371: 1364–1374)* рассматривают эпидемиологию, патогенез и причины хронического кашля. Они отмечают, что хронический кашель, продолжающийся более 8 недель, достаточно распространен, труден для лечения и может быть вызван различными причинами. Авторы подготовили обзор литературы по данной проблеме, который пригодится клиницистам в практической работе.

*M.I.Restrepo et al. (Eur. Respir. J. 2009; 33 (1): 153–159)* изучили влияние макролидов на смертность больных с тяжелым шоком, развившимся при пневмонии. Эта статья поднимает проблему иммуномодулирующего эффекта макролидов при лечении острых респираторных инфекций. Ее полный текст доступен на сайте для членов ERS.

*S.Sethi и T.F.Murphy (N. Engl. J. Med. 2008; 359 (22): 2355–2365)* подготовили блестящую обзорную статью о существующих концепциях роли инфекции в патогенезе развития и течения ХОБЛ. Полностью ее можно найти по ссылке <http://content.nejm.org/cgi/content/full/359/22/2355>.

*J.Garbino et al. (Thorax 2009; 64 (5): 399–404)* представили результаты когортного исследования респираторных вирусов в жидкости бронхоальвеолярного лаважа посредством полимеразной цепной реакции у 299 госпитализированных больных. Выявление вирусов в лаважной жидкости сопровождалось наличием респираторных симптомов, отсутствием инфильтратов в легких. При этом лечение антибиотиками было неэффективным. Наиболее часто встречались коронавирусы, риновирусы и вирусы парагриппа.

*H.C.Roberts et al. (J. Thoracic Oncology 2009; 4 (5): 620–628)* провели скрининг мезотелиомы плевры среди лиц, имевших контакт с асбестом. Злокачественная мезотелиома имеет очень плохой прогноз. В настоящее время раннее мультимодальное лечение, сочетающее хирургию и химиотерапию, может уменьшить смертность и даже привести к излечению у ограниченного числа пациентов. Однако в большинстве случаев эту патологию выявляют поздно. Необходим эффективный метод скрининга мезотелиомы в группах риска. Определение маркеров крови сопровождается большим числом ложнопозитивных реакций. Авторы обратились к методам имидж-диагностики, в частности рентгеновской компьютерной томографии грудной клетки. Эксперты ERS также рекомендуют прочесть более раннюю работу *T.Vierikko et al. (Eur. Respir. J. 2007; 29: 78–84; статья доступна для членов ERS)*.