

Редакционная колонка

Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) относится к числу болезней, которым в последние годы в мире уделяется самое пристальное внимание. Это связано с несколькими причинами. Одна из них — высокая распространенность заболевания, которая в 2–3 раза выше, чем распространенность бронхиальной астмы. По научным прогнозам в ближайшие 10–15 лет ХОБЛ выйдет на 3–4-е место как причина смерти.

Выходящий номер журнала "Пульмонология" в значительной степени посвящен этой проблеме. Рассматриваются различные аспекты морфологических изменений у больных, страдающих хронической обструктивной болезнью органов дыхания, биофизические маркеры воспаления. Хотелось бы привлечь внимание клиницистов к тому, что ХОБЛ в клиническом отношении является очень многоплановой болезнью. Обычно выделяют: эмфизематозный тип и бронхитический тип, т.е. типы заболевания с разным прогнозом, с разной продолжительностью жизни и с некоторыми отличиями течения этой болезни. Вместе с тем клиницисты меньше уделяют внимание таким проблемам, как развитие острой хронической дыхательной недостаточности, развитию острого и хронического легочного сердца, появлению признаков глобальной сердечной недостаточности. К синдромам, которые отягощают течение болезни у больных, страдающих хронической обструктивной болезнью органов дыхания, относят также и синдромы утомления дыхательных мышц, полицитемию и целый ряд других проявлений, которые делают клинику хронической обструктивной болезни органов дыхания и многообразной, и неповторимой, поэтому от врача требуется высокая профессиональная подготовка, чтобы увидеть индивидуальности болезни, которая называется хронической обструктивной болезнью органов дыхания.

*Главный редактор журнала "Пульмонология"
академик РАМН профессор А.Г.Чучалин*