А.А.Тимофеев

**ДЕЙСТВИЕ ТРОВЕНТОЛА НА СЕКРЕЦИЮ ГИСТАМИНА ИЗ
ТУЧНЫХ КЛЕТОК**

НИИ пульмонологии МЗ РФ, Москва

EFFECTS OF TROVENTOL ON HISTAMINE SECRETION FROM MAST CELLS

А.А.Тимофеев

S u m m a r y

In order to investigate the molecular mechanisms of action of anticholinergic agents, the effect of troventol on one of initial chains of bronchospasm — histamine release from mast cell — was assessed. The effect of troventol was compared with atrovent (ipratropium bromide) and atropine. It was found that cells incubation with troventol for 5 min evokes inhibition of histamine release by 47%, and there were no distinctions between placebo and atropine or atrovent. The histamine release from mast cells was caused by abrupt increase in cytosol Ca^{2+} concentration. Passive Ca^{2+} uptake velocity was decreased by troventol (56.3%) and by atrovent (28%), atropine had no influence on it. Thus, unlike atrovent and atropine, troventol can inhibit histamine secretion via reduction of cell membrane permeability for Ca^{2+} .

Р е з ю м е

С целью исследования молекулярного механизма действия антихолинергического препарата тровентола изучали его влияние на одно из начальных звеньев бронхоспазма — высвобождение гистамина. Препаратами сравнения были: атровент (ипратропиума бромид) и атропина сульфат. Обнаружено, что инкубация клеток с тровентолом в течение 5 минут приводит к снижению секреции гистамина на 47,6%. При этом действие атровента и атропина не отличалось от контроля. Выброс гистамина тучными клетками обусловлен резким возрастанием концентрации цитозольного Ca^{2+} . Тровентол на 56,3% уменьшал начальную скорость пассивного входа Ca^{2+} в клетки, атровент на 28%, атропин не изменял значение данного параметра. Таким образом, тровентол в отличие от атропина и атровента может ингибировать секрецию гистамина опосредованно через уменьшение Са-проницаемости клеточных мембран.

Отечественный бронхолитик тровентол, представляющий собой йодметилат тропинового эфира α -оксиметил- α -фенил масляной кислоты, успешно предупреждает экспериментальный бронхоспазм, вызываемый холиномиметиками. Подобное действие препарата обусловлено высокой селективностью его в отношении м-холинорецепторов трахеи и бронхов [4]. Возможно, поэтому препарат не предотвращает сокращение гладкой мускулатуры бронхов, обусловленное гистамином, в эксперименте [1] и в клинике [2], по сравнению с карбахолиновым бронхоспазмом. При различных патологиях легких обострение воспалительной реакции, одним из медиаторов которой является гистамин, может приводить к бронхоспазму [3]. Поскольку тровентол обладает избирательной к ткани легких противовоспалительной активностью, о чем свидетельствуют недавно полученные в нашей лаборатории результаты [5], мы предположили, что препарат может иметь антигистаминное действие, обусловленное не блокадой гистаминовых рецепторов гладких мышц трахеи и бронхов, а ингибированием секреции биогенного амина.

Исходя из этого целью настоящей работы было изучение механизма действия тровентола на секрецию гистамина клетками перитонеального экссудата, неотъемлемой частью которых являются тучные клетки. В качестве препаратов сравнения были выбраны известные бронхолитики из группы М-холинолитиков — атровент и атропина сульфат.

В работе использовали белых беспородных крыс массой 180—200 г, содержащихся на стандартном рационе вивария. Клетки перитонеального экссудата получали по общепринятой методике [6]. В эксперименте использовали суспензию клеток, где число живых клеток составляло более 90%, что определяли с помощью окраски трипановым синим. Секрецию гистамина определяли спектрофотометрически по реакции с о-фталевым диальдегидом [9,10]. Пассивную Са-проницаемость клеточных мембран изучали с помощью включения в клетки флюоресцентного Са-индикатора квина-2АМ ("Sigma", США) [8].

Рис. 1. Действие исследуемых бронхолитиков на секрецию гистамина.

Здесь и на рис. 2 Тр — тровентол; Ав — атровент; Ап — атропин.

Рис. 2. Влияние исследуемых препаратов на пассивный вход ионов Са²⁺ в клетки. К — контроль.

Полученные результаты статистически обрабатывали с использованием непараметрического критерия Вилкоксона-Манна-Уитни.

После активации клеток перитонеального экссудата форболмиристатацетатом (ФМА) наблюдалась секреция гистамина (рис. 1), которая более чем на 20% превышала уровень спонтанной секреции. Тровентол в концентрации 10^{-3} мг/мл на 47,6% от максимального уровня ингибировал секрецию амина в отличие от атровента и атропина. Секреция гистамина во многом определяется внутриклеточной концентрацией ионов Са²⁺, которая зависит от Са-проницаемости плазматических мембран клеток [11]. Поэтому интересно было оценить возможное действие тровентола на Са-проницаемость клеточных мембран.

В результате проведенных измерений выявлено, что тровентол в концентрации 10^{-3} мг/мл на 56,3% уменьшает начальную скорость пассивного входа Са²⁺ в клетки, атровент — на 28%, а атропин не влиял на этот параметр (рис. 2).

Итак, тровентол больше, чем атровент и атропин, угнетал вход Са²⁺ в клетки, так же, как и секрецию гистамина. Видимо, это обусловлено большей селективностью тровентола к м-холинорецепторам [4]. Так как холинорецепторы функционально сопряжены с химически возбудимыми Са-каналами [7], тровентол, ингибируя функцию рецептора, может опосредованно угнетать и Са-проводимость мембраны.

Таким образом, мы предполагаем, что тровентол, в опытах *in vitro* в концентрации 1×10^{-3} мг/мл, уменьшая Са-проницаемость плазматической мембраны, опосредованно угнетает секрецию гистамина клетками перитонеального экссудата.

ЛИТЕРАТУРА

1. Румянцев Е.А., Шварц Г.Я. // Всесоюзный конгресс по болезням органов дыхания, 1-й: Тезисы докладов. — Челябинск, 1991. — С.256.
2. Сиротин Е.А., Лимаренко Е.А. // Там же. — С.256.
3. Чучалин А.Г. Бронхиальная астма. — М., 1985.
4. Шварц Г.Я. // Новые возможности бронхорасширяющей терапии: Материалы симпозиума. — Л., 1989. — С.7—16.
5. Ягмуров Б.Х., Тимофеев А.А., Соодаева С.К., Чучалин А.Г. // Бюл. exper. биол. — 1994. — № 6. — С.619—621.
6. Bechard D.E., Fisher B.J., Kessler F.K., Carchman R.A., Fowler A.A. // J. Clin. Lab. Immunol. — 1988. — Vol.26. — P.67—71.
7. Eldefrawi M.E., Eldefrawi A.T., Penfield L.A., O'Brien R.D., Van Campen D. // Life Sci. — 1975. — Vol.16. — P.925—936.
8. Johansson J.J., Haynes D. // J. Membir Biol. — 1988. — Vol.104. — P.117—163.
9. Mannaioni P.F., Giannella E., Palmerani B., Pistelli A., Gambassi F., Bani-Sacchi T., Bianchi S., Masini E. // Agenst and Actions. — 1988. — Vol.23, № 3/4. — P.129—142.
10. Shore P.A., Burkhalter A., Cohn V.H. Jr. // J. Pharmacol. Exp. Ther. — 1959. — Vol.127. — P.182—186.
11. Takei M., Urashima H., Endo K., Muramatu M. // Biol. Chem. Hoppe-Seyler. — 1989. — Vol.370. — P.1—10.

Поступила 12.07.96.